



Fiche d'informations pré-opératoires

Votre examen dermatologique a permis de diagnostiquer une lésion cutanée qui doit être traitée chirurgicalement. Afin que vous soyez clairement informé du déroulement de cette opération et de ses suites, nous vous demandons de lire attentivement ce document d'information. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

But de l'intervention

Cette intervention est justifiée pour l'ablation de votre tumeur et pour en préciser la nature exacte. En effet, seul l'examen anatomopathologique au microscope de la pièce opératoire permet de définir la **nature bénigne ou maligne de la lésion** et surtout de confirmer que la **tumeur a été enlevée en totalité**. Si tel n'est pas le cas, une deuxième intervention peut être nécessaire pour retirer les résidus tumoraux.

Réalisation de l'intervention

L'intervention a lieu au bloc opératoire sous anesthésie locale ou sédation appelée diazanalgésie. La tumeur doit être enlevée avec une marge de sécurité. Plusieurs techniques sont possibles pour fermer la perte de substance :

- Suture simple pour une perte de substance minimale
- Greffe de peau totale (prélevée à distance de la tumeur)
- Mobilisation de la peau à proximité (lambeau régional)

Dans certaines localisations ou situations, cette reconstruction peut être différée ou nécessiter plusieurs temps opératoires.

Risques immédiats

Comme tout acte opératoire, une complication post-opératoire peut survenir : saignement ou hématome, infection locale, trouble de la cicatrisation, avec désunion de cicatrice, voire nécrose du lambeau ou de la greffe.

Risques secondaires

Malgré toutes les précautions prises lors des sutures, on peut observer des cicatrices de mauvaise qualité voire disgracieuses.

Lorsque la tumeur est étendue ou située autour d'un orifice, on ne peut pas toujours éviter les conséquences fonctionnelles ou esthétiques malgré une reconstruction adaptée.

Risques à distance

Même après une exérèse complète, une tumeur cutanée peut récidiver après plusieurs années. Des examens réguliers sont donc nécessaires pour dépister l'apparition d'une récidive ou d'une autre tumeur cutanée de la face.